Table S1. Additional characteristics of study participants

	All participants (n=15,819)	PS group (n=5122)	Non-PS group (n=10,697)	p-value
Total weekly MVPA (min/wk)				< 0.001
0	11,593 (73.3)	4,095 (79.9)	7,498 (70.1)	
1–149	1,617 (10.2)	392 (7.7)	1,255 (11.5)	
≥150	2,609 (16.5)	635 (12.4)	1,974 (18.5)	
Total daily MPA (min/day)				< 0.001
0	12,545 (79.3)	4,300 (84.0)	8,245 (77.1)	
1–29	1,914 (12.1)	488 (9.5)	1,426 (13.3)	
≥30	1,360 (8.6)	334 (6.5)	1,026 (9.6)	
Total daily VPA (min/day)				< 0.001
0	13,941 (88.1)	4,685 (91.5)	9,256 (86.5)	
1–19	1035 (6.5)	260 (5.1)	775 (7.2)	
≥20	843 (5.3)	177 (2.2)	666 (6.2)	
Leisure-time daily MPA (min/day)				< 0.001
0	12,722 (80.4)	4,353 (85.0)	8,369 (78.2)	
1–29	1,906 (12.0)	479 (9.4)	1,427 (13.3)	
≥30	1,191 (7.5)	290 (5.7)	901 (8.4)	
Leisure-time daily VPA (min/day)				< 0.001
0	14,131 (89.3)	4,750 (92.7)	9,381 (87.7)	
1–19	999 (6.3)	241 (4.7)	758 (7.1)	
≥20	689 (4.4)	131 (2.6)	558 (5.2)	
Occupational daily MPA (min/day)				0.223
0	15,604 (98.6)	5,063 (98.8)	10,541 (98.5)	
1–29	40 (0.3)	13 (0.3)	27 (0.3)	
≥30	175 (1.1)	46 (0.9)	129 (1.2)	
Occupational daily VPA (min/day)				0.861
0	15,565 (98.4)	5,041 (98.4)	10,524 (98.4)	
1–19	110 (0.7)	37 (0.7)	73 (0.7)	
≥20	144 (0.9)	44 (0.9)	100 (0.9)	

Values are presented as number (%).

PS, possible sarcopenia; MVPA, moderate-to-vigorous physical activity; MPA, moderate physical activity VPA, vigorous physical activity.