SUPPLEMENTARY MATERIALS

Table S1. Differences in percent frequencies of age, sex, smoking, and alcohol consumption at baseline between the present sample and the original total sample

	Present sample (n=6,654)	Total sample (n=45,071)	Difference in percent frequency[a)]
Age (y)			
40–49	450 (6.4)	9,064 (20.1)	-13.80
50–59	1,558 (22.3)	12,972 (28.8)	-6.50
60–69	3,880 (54.6)	16,632 (36.9)	17.70
70–74	1,198 (16.7)	6,403 (14.2)	2.50
Sex			
Men	3,236 (45.2)	21,880 (48.5)	-3.40
Women	3,850 (54.8)	23,191 (51.5)	3.40
Smoking (cigarettes/day)			
0 (Non-smoker)	4,016 (57.0)	22,114 (49.2)	7.70
0 (Past smoker)	2,086 (29.4)	12,892 (28.7)	0.70
1–19	446 (6.3)	4,671 (10.4)	-4.10
≥20	526 (7.4)	5,230 (11.6)	-4.30
Alcohol consumption (g ethanol/week)			
0 (Abstainer)	2,330 (33.1)	13,812 (30.7)	2.40
0 (Past drinker)	197 (2.8)	1,755 (3.9)	-1.10
>0, <150	2,496 (35.2)	15,500 (34.4)	0.80
≥150, <300	899 (12.6)	5,666 (12.6)	0.10
≥300, <450	667 (9.3)	4,168 (9.3)	0.10
≥450	496 (7.0)	4,151 (9.2)	-2.20

Values are presented as number (%).

[a)]Percent frequency of the total sample subtracted from percent frequency of the subsample.